

Instructies na immmediaat plaatsen gebitsprothese.

1. Vandaag de mond niet spoelen, geen alcohol en geen warme dranken drinken zoals koffie of thee. Dit kan een nabloeding veroorzaken. De eerste weken na de ingreep niet roken, dit kan een vertraagde wondgenezing tot gevolg hebben.
2. Houdt u de prothese in tot uw volgende afspraak. Dan nemen wij de prothese uit en verwijderen wij eventuele drukplaatsen.
3. Na thuiskomst een ijszak in een washandje of een coldpack tegen de lip of wang houden gedurende een half uur. Dit 5 maal herhalen met tussenpauzes van een half uur (half uur tegen lip of wang, half uur eraf). Dit gaat eventuele zwelling en/of blauw worden tegen.
4. Gebruik eventueel een extra hoofdkussen tijdens het slapen, zodat het hoofd wat hoger ligt.
5. Na thuiskomst mag u bij pijn steeds 2 paracetamol innemen met een maximum van 8 per dag.
6. Eet de eerste dagen zo zacht mogelijk. U moet wennen aan het dragen van een prothese en dit heeft tijd nodig.
7. Bij problemen kunt u tijdens kantooruren altijd bellen naar de praktijk, tel.nr: 040-3033773.