

Instructies na behandeling peri-implantitis.

1. Vandaag de mond niet spoelen, geen alcohol en geen warme dranken drinken zoals koffie of thee. Dit kan een nabloeding veroorzaken.
Belangrijk dat u niet rookt, dit kan een vertraagde wondgenezing tot gevolg hebben. Op de langere termijn kan roken botverlies veroorzaken rond de implantaten waardoor implantaten los kunnen komen.
2. Na thuiskomst een ijszak in een washandje of een coldpack tegen de lip of wang houden gedurende een half uur. Dit 5 maal herhalen met tussenpauzes van een half uur (half uur tegen lip of wang, half uur eraf).
Dit gaat eventuele zwelling en/of blauw worden tegen.
3. U heeft voor de behandeling antibiotica gekregen. U dient tot 1 week na de behandeling, 3x daags een capsule antibiotica in te nemen volgens recept (iedere 8 uur). Let op; de anticonceptiepil is dan minder betrouwbaar.
Het is belangrijk de gehele kuur af te maken.
4. Gebruik eventueel een extra hoofdkussen tijdens het slapen, zodat het hoofd wat hoger ligt.
5. Vanaf morgen 2 maal daags spoelen met Perio-Aid spoelvloeistof gedurende 2 weken (tot de hechtingen verwijderd zijn). Dit kan een bruine aanslag geven op de tong en de tanden.
6. Na thuiskomst mag u bij pijn steeds 2 paracetamol nemen met een maximum van 8 per dag.
7. Bij problemen kunt u tijdens kantooruren altijd bellen naar de praktijk, telnr: 040-3033773.